

## ГРИПП:

Ежегодно, до начала эпидемического сезона.

- Взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских, образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, социального обслуживания, сотрудники правоохранительных органов, люди, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ, государственные гражданские и муниципальные служащие)
- Студентам
- Беременным женщинам
- Взрослым старше 60 лет
- Лицам, подлежащим призыву на военную службу
- Лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением
- Работникам профессиональных групп риска (работники общепита, промышленных предприятий, птицеводческих хозяйств)
- Прочим взрослым



# РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 18 ЛЕТ



Областной центр  
общественного здоровья  
и медицинской профилактики

[profilaktica.ru](http://profilaktica.ru)



8 800 200 0 200  
[TAKZDOROVU.RU](http://TAKZDOROVU.RU)

Официальный портал  
Минздрава России



Здоровье уральцев  
Информационный сетевой ресурс



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

## ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК:

**Ранее не привитым взрослым от 18 лет и старше:** вакцинация двукратно с интервалом 30 дней, ревакцинация через 6–9 месяцев. Последующие ревакцинации каждые 10 лет.

**Ранее привитым:** ревакцинация каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.

## КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ:

Ранее не привитым взрослым вакцинация проводится двукратно с интервалом между инъекциями 1–7 месяцев. Первая ревакцинация проводится через 1 год после второй вакцинирующей прививки. Последующие ревакцинации — каждые 3 года.

Схема вакцинации зависит от вида вакцины.

## ГЕПАТИТ В:

Взрослым от 18 до 55 лет, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В по схеме 0–1–6 месяцев.

**Медицинские работники** — вакцинация без ограничения возраста.

Ревакцинация проводится медицинским работникам по результатам лабораторного обследования; лицам, находящимся на гемодиализе, каждые 3 года.

## ГЕПАТИТ А:

Лицам, проживающим в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусными гепатитами А; лицам, выезжающим в неблагополучные страны, где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А; лицам, подверженным профессиональному риску заражения. Схема 0–6(12) месяцев.

## КРАСНУХА:

**Женщинам** от 18 до 25 лет (включительно), не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против краснухи — двукратно с интервалом 3 месяца.

**Привитым однократно против краснухи** — однократно.

## ВЕТРЯНАЯ ОСПА:

**Взрослым из групп риска, ранее не привитым и не болевшим ветряной оспой:** пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, женщины, планирующие беременность, лица, подлежащие призыву на военную службу, медицинские работники, работники образовательных организаций и организаций стационарного социального обслуживания, пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, лица, выезжающие в загородные оздоровительные учреждения. Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией к препарату.

## ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ:

**Женщинам от 18 до 45 лет,** схема вакцинации зависит от применяемой вакцины.

## ШИГЕЛЛЕЗЫ:

Лицам, подверженным профессиональному риску заражения. Однократно, ежегодно.

## МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ:

Лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам из групп риска. Вакцинация проводится однократно.

## КОРЬ:

**Взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против кори** — двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

**Взрослым до 35 лет (включительно), имеющим одну прививку** — однократно.

**Взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группе риска:** работники медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ — двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

**Взрослым без ограничения возраста:** работникам медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против кори — двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

## КОКЛЮШ:

**Взрослым ревакцинация каждые 10 лет,** к приоритетным группам относятся: работники медицинских и образовательных учреждений, учреждений социального обеспечения, лица с хронической бронхолегочной патологией, с иммунодефицитными состояниями, взрослые в семьях, где есть новорожденные и не привитые дети до 1 года жизни, женщины, планирующие беременность, военнослужащие.

## ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ:

Лицам из группы риска, в том числе с хроническими заболеваниями.

**Взрослым старше 60 лет,** проживающим в организациях социального обслуживания, лицам, подлежащим призыву на военную службу.